葉身ハホボ圓形、先ハ丸ク長サ 30 mm ヲ出デズ、無毛無柄ナリ、
..................................まるばやまとらのを
葉身ハ廣卵形乃至帶卵披針形先ハ鋭尖。
草ハ花序ヲ併セテモ高サ 30 cm ヲ出デズ、通例 10 乃至 25 cm ナリ、莖ニ葉ガ密生ス、葉ハ卵形又ハ長橢圓形、稍莖ヲ抱ク、......伽倻山とらのを
草ハ花序ヲ併セテ高サ 1–1.5 米トナル、葉ハ無柄。
葉身ハ卵形又ハ帶卵長橢圓形、多少微毛アリ。
葉緣ニハ齊一ノ鋸齒アリ、..........................るりとらのを
葉身ハ長橢圓形兩端トガリ葉緣ハ殆ンド全緣ナリ、
..............................ながばるりとらのを
葉身ハ橢圓形、無毛、緣ニ粗大ノ鋸齒アリ、............みねとらのを

○白花ながばのうなぎつかみ (檜山庫三)

ながばのうなぎつかみノ白花品ガ東京新市内ニ産シ紅紫花品ト混生スル。之ヲしろばなながばのうなぎつかみト新稱スル。

Persicaria hastato-sagittata NAKAI f. **albiflora** HIYAMA, f. n. Flores albi.

Hab. in Honsyu. Prov. Musasi: Mizumoto. (K. HIYAMA, Sept. 6, 1942.—in Herb. Tokyo Sci. Mus.)

○みつばさはひよどりノ學名 (檜山庫三)

從來みつばさはひよどりノ學名ニハ *Eupatorium Lindleyanum* DC. var. *trifoliolatum* MAK. ガ使ハレテ來タガ、又學者ニヨリ變種トシテノ存在ヲ認メヌ事モアル。實際さはひよどりデハ無分裂葉ト三全裂葉ノ間ニハ様々ナ間型ガ認メラレルカラ變種トシテノ價値ハ認メ難イガ、併シ全然區別セヌノモ適當デナイカラコヽデハ品種說ヲ主張スル。尙變種說ヲ採ル場合、變種名ハ var. *trisectifolium* MAK. ノ方ガ早イ。

Eupatorium Lindleyanum A. P. DU CANDOLLE f. **trisectifolium** (MAKINO) HIYAMA, comb. nov.

Eupatorium Lindleyanum DC. var. *trisectifolium* MAKINO in IINUMA, Sômoku-dzusetsu ed. MAKINO III. p. 1059 (1912) in nota.—*Eupatorium Lindleganum* DC. var. *trifoliolatum* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo, XXVII. p. 80 (1913)—*Eupatorium Lindleyanum* DC. sensu KITAMURA in Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. ser. B. vol. XIII. p. 287 (1937) p.p.